


新冠疫苗



什麼是新冠疫苗

新冠疫苗保護您免受新冠病毒的侵害。
您接受兩次在上臂部位的接種注射。
注射後，您因感染病毒而患病的機率較小。

您體內發生了什麼變化

疫苗接種使得您體內產生對抗病毒的抗體。
因此，您的身體會在接種疫苗後識別出該病毒，
並可以迅速殺死病毒。您不會因而患病或患病機率減少。

目前尚不了解疫苗接種預防新冠病毒的保護期持續多久。

新冠疫苗安全嗎

與其他相比，疫苗的研製速度比較快，
這是因為世界各地的許多人共同研製疫苗。
其中沒有跳過任何環節，這也是不可能的，因為製造疫苗的規則非常嚴格。
研製出疫苗後，便對其進行了測試。

疫苗已獲得歐洲組織EMA（歐洲藥品管理局）的批准。
荷蘭組織CBG（荷蘭藥品評估委員會）是該組織的一部分。

副作用

與其他疫苗一樣，接種疫苗後您可能會出現不適，這就是所謂的副作用。

例如，您可能會出現以下不適症狀：



- 注射部位疼痛
- 頭痛
- 疲勞
- 肌肉酸痛
- 發燒

這些不適症狀通常會持續1至3天。

與第一劑注射相比，您在第二劑注射後可能會出現更多的上述不適症狀。

我們將在幾年後才能真正確定，但您以後出現其他不適症狀的機率很小。

如果在疫苗接種後出現嚴重不適，請致電您的家庭醫生。



誰應該接受疫苗接種

在荷蘭，18歲及以上的人士會收到接種疫苗的邀請函。

不可能同時為所有人接種疫苗。

當輪到您接種疫苗時，您在家中會收到一封邀請函。

目前有3種不同的疫苗。

您無法選擇接種哪一種疫苗。

何時不可接種疫苗

存在以下情況時，請致電您的家庭醫生：

- 以前接種疫苗後曾出現過敏反應
- 第一劑疫苗接種後出現嚴重的過敏反應

如果出現以下情況，您最好推遲疫苗接種並重新預約：

- 病重或發高燒
- 患有新冠肺炎
- 出現新冠肺炎常見的不適症狀
- 如果您已接受新冠測試，但尚未得知檢測結果
- 如果您曾與新冠患者有過接觸

懷孕

您懷孕了嗎？那麼最好將疫苗接種推遲到孕期後再進行。

如果您患有某種疾病，可能會因為感染新冠病毒而加重病情，那麼接種疫苗有時還是明智的選擇。請致電您的家庭醫生，諮詢最佳選擇方案。

接種疫苗後

接種疫苗後，仍應遵循一般建議，例如洗手並保持距離。

如果您還是出現了新冠肺炎症狀，請接受測試。

目前尚不清楚您在接種疫苗後是否可以將病毒傳播給其他人。而且，您仍然有可能因感染病毒而患病。



**關於新冠病毒，您若還有其他的問題：
請致電0800-1351諮詢。**