

新冠疫苗



什么是新冠疫苗

新冠疫苗保护您免受新冠病毒的侵害。

您接受在上臂部位的接种注射。

接种疫苗后，您不会因感染病毒而患病，或病情相对轻微。

您体内发生了什么变化

疫苗接种使得您体内产生对抗病毒的抗体。

因此，您的身体会在接种疫苗后识别出该病毒，

并可以迅速杀死病毒。您不会因而患病或患病几率减少。

目前尚不了解疫苗接种预防新冠病毒的保护期持续多久。

新冠疫苗安全吗

与其他相比，疫苗的研制速度比较快，

这是因为世界各地的许多人共同研制疫苗。

其中没有跳过任何环节，这也是不可能的，因为制造疫苗的规则非常严格。

疫苗研制成功后，便在许多人对它们进行了测试。

之后，由EMA（欧洲药品管理局）和CBG（荷兰药品评估委员会）机构加以认可。

现在已使用这些疫苗，并仍继续监控其安全性。

副作用

与其他疫苗一样，接种疫苗后您可能会出现不适，这就是所谓的副作用。



例如，您可能会出现以下不适症状：

- 注射部位疼痛
- 头痛
- 疲劳
- 肌肉酸痛
- 发烧

这些不适症状通常会持续1至3天。

这些是轻微的副作用。它们很常见，几天后会自行消失。

严重的副作用很少见。但是，如果您在接种疫苗后的几周内出现严重不适，请致电家庭医生咨询。



谁应该接受疫苗接种

在荷兰，18岁及以上的人士会收到接种疫苗的邀请函。

不可能同时为所有人接种疫苗。

当轮到您接种疫苗时，您在家中会收到一封邀请函。

目前有几种不同的疫苗。

您无法选择接种哪一种疫苗。

何时不可接种疫苗

存在以下情况时，请致电您的家庭医生：

- 以前接种疫苗后曾出现过敏反应
- 第一剂疫苗接种后出现严重的过敏反应

如果出现以下情况，您最好推迟疫苗接种并重新预约：

- 接种疫苗的当天病重
- 发烧38度或以上
- 患有新冠肺炎
- 出现新冠肺炎常见的不适症状
- 如果您已接受新冠测试，但尚未得知检测结果
- 如果您曾与新冠患者有过接触

怀孕

您怀孕了吗？那么最好将疫苗接种推迟到孕期后再进行。

您已经怀孕并患有肺部疾病吗？新冠病毒则可能导致您病情的加重，那么最好还是接种疫苗。请咨询您的家庭医生或助产士。

接种疫苗后

接种疫苗后，仍应遵循一般建议，例如洗手并保持距离。

如果您还是出现了新冠肺炎症状，请接受测试。

目前尚不清楚您在接种疫苗后是否可以将病毒传播给其他人。

而且，您仍然有可能因感染病毒而患病。



关于新冠病毒，您若还有其他的问题：

请致电0800-1351咨询。