

# 新冠疫苗



## 什麼是新冠疫苗

新冠疫苗保護您免受新冠病毒的侵害。  
您接受在上臂部位的接種注射。  
接種疫苗後，您不會因感染病毒而患病，  
或病情相對輕微。

## 您體內發生了什麼變化

疫苗接種使得您體內產生對抗病毒的抗體。  
因此，您的身體會在接種疫苗後識別出該病毒，  
並可以迅速殺死病毒。您不會因而患病或患病機率減少。

目前尚不了解疫苗接種預防新冠病毒的保護期持續多久。

## 新冠疫苗安全嗎

與其他相比，疫苗的研製速度比較快，  
這是因為世界各地的許多人共同研製疫苗。  
其中沒有跳過任何環節，這也是不可能的，因為製造疫苗的規則非常  
嚴格。

疫苗研製成功後，便在許多人中對它們進行了測試。  
之後，由EMA（歐洲藥品管理局）和CBG（荷蘭藥品評估委員會）  
機構加以認可。

現在已使用這些疫苗，並仍繼續監控其安全性。

## 副作用

與其他疫苗一樣，接種疫苗後您可能會出現不適，這就是所謂的副作用。


例如，您可能會出現以下不適症狀：

- 注射部位疼痛
- 頭痛
- 疲勞
- 肌肉酸痛
- 發燒

這些不適症狀通常會持續1至3天。

這些是輕微的副作用。它們很常見，幾天後會自行消失。

嚴重的副作用很少見。但是，如果您在接種疫苗後的幾週內出現嚴重  
不適，請致電家庭醫生諮詢。



## 誰應該接受疫苗接種

在荷蘭，18歲及以上的人士會收到接種疫苗的邀請函。

不可能同時為所有人接種疫苗。

當輪到您接種疫苗時，您在家中會收到一封邀請函。

目前有幾種不同的疫苗。

您無法選擇接種哪一種疫苗。

## 何時不可接種疫苗

存在以下情況時，請致電您的家庭醫生：

- 以前接種疫苗後曾出現過敏反應
- 第一劑疫苗接種後出現嚴重的過敏反應

如果出現以下情況，您最好推遲疫苗接種並重新預約：

- 接種疫苗的當天病重
- 發燒38度或以上
- 患有新冠肺炎
- 出現新冠肺炎常見的不適症狀
- 如果您已接受新冠測試，但尚未得知檢測結果
- 如果您曾與新冠患者有過接觸

## 懷孕

一組醫生和科學家們就妊娠期間的疫苗接種展開了研究。

他們的建議是：所有孕婦都可以接種新冠疫苗。

就此請諮詢您的家庭醫生或助產士。

## 接種疫苗後

接種疫苗後，仍應遵循一般建議，例如洗手並保持距離。

如果您還是出現了新冠肺炎症狀，請接受測試。

目前尚不清楚您在接種疫苗後是否可以將病毒傳播給其他人。

而且，您仍然有可能因感染病毒而患病。



**關於新冠病毒，您若還有其他的問題：  
請致電0800-1351諮詢。**