

# 新冠疫苗

## 什麼是新冠疫苗

新冠疫苗保護您免受新冠病毒的侵害。  
您接受在上臂部位的接種注射。  
接種疫苗後，您不會因感染病毒而患病，或病情相對輕微。




## 您體內發生了什麼變化

疫苗接種使得您體內產生對抗病毒的抗體。  
因此，您的身體會在接種疫苗後識別出該病毒，  
並可以迅速殺死病毒。您不會因而患病或患病機率減少。

目前尚不了解疫苗接種預防新冠病毒的保護期持續多久。

## 新冠疫苗安全嗎

與其他相比，疫苗的研製速度比較快，  
這是因為世界各地的許多人共同研製疫苗。  
其中沒有跳過任何環節，這也是不可能的，因為製造疫苗的規則非常嚴格。



疫苗研製成功後，便在許多人中對它們進行了測試。  
之後，由EMA（歐洲藥品管理局）和CBG（荷蘭藥品評估委員會）  
機構加以認可。

與此同時，輝瑞/BioNTech 疫苗也在 12 歲以上的兒童中進行了測試，  
該疫苗也被批准用於這組人群。

現在已使用這些疫苗，並仍繼續監控其安全性。

## 副作用


與其他疫苗一樣，接種疫苗後您可能會出現不適，這就是所謂的副作用。

例如，您可能會出現以下不適症狀：

- 注射部位疼痛
- 頭痛
- 疲勞
- 肌肉酸痛
- 發燒

這些是輕微的副作用。它們很常見，幾天後會自行消失。

嚴重的副作用很少見。但是，如果您在接種疫苗後的幾週內出現嚴重不適，請致電家庭醫生諮詢。



## 誰應該接受疫苗接種

在荷蘭，任何年滿 12 歲的人都可以預約接種疫苗。

預約可在線或通過電話進行。

您可在以下網站上預約：[www.coronavaccinatie-afspraak.nl](http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl)。

電話預約請撥打：0800 7070。

目前有幾種不同的疫苗。

您無法選擇接種哪一種疫苗。

所有使用的疫苗都已經過測試和批准。

## 何時不可接種疫苗

存在以下情況時，請致電您的家庭醫生：

- 以前接種疫苗後曾出現過敏反應
  - 第一劑疫苗接種後出現嚴重的過敏反應
- 如果出現以下情況，您最好推遲疫苗接種並重新預約：

- 接種疫苗的當天病重
- 發燒38度或以上
- 患有新冠肺炎
- 出現新冠肺炎常見的不適症狀
- 如果您已接受新冠測試，但尚未得知檢測結果
- 如果您曾與新冠患者有過接觸

## 懷孕

一組醫生和科學家們就妊娠期間的疫苗接種展開了研究。他們的建議是：所有孕婦都可以接種新冠疫苗。

## 接種疫苗後

如果您在接種疫苗後仍然出現新冠症狀，請進行檢測。

接種疫苗後，您將病毒傳染給其他人的可能性較小。但是，在接種疫苗後您仍可能傳播病毒。

接種疫苗後，仍應遵循一般性建議，例如洗手和開窗。



**關於新冠病毒，您若還有其他的問題：  
請致電0800-1351諮詢。**