

# واکسن ضد کرونا



## واکسن ضد کرونا چیست

واکسن ضد کرونا شما را در برابر ویروس کرونا محافظت می کند. واکسن در بازو شما تزریق میشود. بعد از واکسیناسیون ویروس شما را بیمار نمیکند یا کمتر بیمار میکند.

## در بدن شما چه اتفاق می افتد

واکسیناسیون باعث ایجاد آنتی بادی علیه ویروس می شود. در نتیجه ، بدن شما ویروس را پس از واکسیناسیون تشخیص می دهد. بدن شما می تواند به سرعت ویروس را از بین ببرد. شما کمتر هیچ یا بیمار نمیشوید یا کمتر بیمار میشوید هنوز مشخص نیست که واکسیناسیون برای چه مدتی در برابر کرونا محافظت می کند.

## آیا امن است

واکسن ها سریعتر از حد معمول ساخته شده اند. این بدان دلیل است که افراد زیادی در سراسر جهان با هم روی واکسن کار کرده اند. هیچ چیز نادیده گرفته نشده است. این ممکن هم نیست ، زیرا قوانین ساخت واکسن بسیار سخت است.

این واکسن ها توسط سازمان اروپایی EMA تأیید شده اند.

سازمان هلندی MEB بخشی از این سازمان است.

واکسن فا پزر / بیون تک اکنون نیز روی کودکان ۱۲ سال به بالا آزمایش شده است. این واکسن نیز برای آنها تأیید شده است.

اکنون واکسن ها استفاده میشوند و بررسی های ایمنی هنوز در جریان است.

## اثرات جانبی

مانند سایر واکسن ها ، میتوانید پس از واکسیناسیون دچار شکایت شوید. که به آن اثرات جانبی گفته می شود.

به عنوان مثال ، شما می توانید از موارد زیر رنج ببرید:

• درد در جای تزریق

• سردرد



• خسته بودن

• کشیدگی عضله

• تب

اینها عوارض جانبی خفیفی هستند. آنها شایع هستند و پس از چند روز خود به خود از بین می روند.

عارضه جانبی جدی به ندرت اتفاق می افتد. اما اگر در هفته های بعد از واکسیناسیون مشکلات سلامتی زیادی دارید، با پزشک خانواده تماس بگیرید.





**واکسیناسیون برای چه کسی است**  
در هلند ، افراد ۱۲ سال به بالا می توانند برای واکسینه شدن درخواست قرار ملاقات کنند.  
این کار را می توان بصورت آنلاین یا تلفنی انجام داد.  
آنلاین می توانید از طریق [www.coronavaccinatie-afspraak.nl](http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl) وقت بگیرید.  
یا از طریق شماره تلفن 0800 7070 وقت بگیرید.

چندین نوع واکسن وجود دارد.  
شما نمی توانید نوع واکسن را انتخاب کنید.  
همه واکسن های مورد استفاده آزمایش و تأیید شده اند.

### در کدام صورت واکسینه نمی شوید

- با پزشک عمومی تماس بگیرید اگر:
- در گذشته پس از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته اید
  - پس از تزریق ۱ واکنش آلرژیک شدید داشته اید



بهتر است واکسیناسیون خود را به تعویق بیندازید و قرار ملاقات جدید بگیرید، اگر:

- بسیار بیمار هستند یا تب شدید دارید
- کرونا دارید
- شکایتی داشته باشید که اغلب با کرونا ربط دارد
- اگر تست کرونا را انجام داده اید و هنوز نتیجه را نمی دانید
- اگر با شخصی در تماس بودید که کرونا دارد

### باردار

گروهی از پزشکان و دانشمندان در مورد واکسن در دوران بارداری تحقیق کردند.

توصیه آنها این است که همه زنان باردار می توانند علیه کرونا واکسینه شوند.

### بعد از واکسیناسیون

اگر با اینکه واکسینه شده اید علائم کرونا را در خود مشاهده کردید ، آزمایش دهید.

پس از واکسیناسیون ، احتمال انتقال ویروس به افراد دیگر کمتر است  
اما شما همچنین می توانید ویروس را پس از واکسیناسیون منتقل کنید.



پس از واکسیناسیون ، همچنان توصیه های کلی مانند شستن دست ها و باز کردن پنجره ها را دنبال کنید.

### یک شات اضافی

از دسامبر 2021 می توانید یک شات اضافی دریافت کنید اگر:

- سال یا بزرگتر هستند 80
  - در خانه یا موسسه سالمندان زندگی می کنید
  - با بیماران سر و کار دارید
- شات اضافی احتمال بیماری شدید را کمتر میکند  
شات اضافی را بوستر شات نیز می نامند

### آیا سوالات دیگری در مورد ویروس کرونا دارید:

با شماره 0800-1351 تماس بگیرید.