

新冠疫苗



什么是新冠疫苗

新冠疫苗保护您免受新冠病毒的侵害。

您接受在上臂部位的接种注射。

接种疫苗后，您不会因感染病毒而患病，或病情相对轻微。

您体内发生了什么变化

疫苗接种使得您体内产生对抗病毒的抗体。

因此，您的身体会在接种疫苗后识别出该病毒，并可以迅速杀死病毒。您不会因而患病或患病几率减少。

目前尚不了解疫苗接种预防新冠病毒的保护期持续多久。

新冠疫苗安全吗

与其他相比，疫苗的研制速度比较快，

这是因为世界各地的许多人共同研制疫苗。

其中没有跳过任何环节，这也是不可能的，因为制造疫苗的规则非常严格。

疫苗研制成功后，便在许多人对它们进行了测试。

之后，由EMA（欧洲药品管理局）和CBG（荷兰药品评估委员会）机构加以认可。

与此同时，辉瑞/BioNTech 疫苗也在 12 岁以上的儿童中进行了测试，该疫苗也被批准用于这组人群。

副作用

与其他疫苗一样，接种疫苗后您可能会出现不适，这就是所谓的副作用。

例如，您可能会出现以下不适症状：

- 注射部位疼痛
- 头痛
- 疲劳
- 肌肉酸痛
- 发烧

严重的副作用很少见。但是，如果您在接种疫苗后的几周内出现诸多不适症状，请致电家庭医生咨询。

谁应该接受疫苗接种

在荷兰，任何年满 12 岁的人都可以预约接种疫苗。

预约可在线或通过电话进行。


您可在以下网站上预约：www.coronavaccinatie-afspraak.nl。

电话预约请拨打：0800 7070。

目前有几种不同的疫苗。

您无法选择接种哪一种疫苗。

所有使用的疫苗都已经过测试和批准。



怀孕

孕妇更容易因感染新冠病毒而病情加重。

因此，建议是：如果您已怀孕或尝试怀孕，请接种疫苗。
该建议来自于荷兰的妇科医生、产科医生和儿科医生。

安全

医生和科学家们就怀孕期间的疫苗接种进行了研究。

研究表明：

- 疫苗对孕妇是安全的
- 如果您尝试怀孕，疫苗是安全的
- 疫苗对您腹中的胎儿是安全的
- 疫苗大大降低您因感染新冠病毒而病重的几率
- 如果您是母乳喂养，疫苗是安全的

您尚不确定是否接种疫苗吗？请咨询您的助产士或妇科医生。

何时不可接种疫苗

存在以下情况时，请致电您的家庭医生：

- 以前接种疫苗后曾出现过过敏反应
 - 第一剂疫苗接种后出现严重的过敏反应
- 如果出现以下情况，您最好推迟疫苗接种并重新预约：

- 接种疫苗的当天病重
- 发烧38度或以上
- 患有新冠肺炎
- 出现新冠肺炎常见的不适症状
- 如果您已接受新冠测试，但尚未得知检测结果
- 如果您曾与新冠患者有过接触

接种疫苗后

如果您在接种疫苗后仍然出现新冠症状，请进行检测。

接种疫苗后，您将病毒传染给其他人的可能性较小。

但是，在接种疫苗后您仍可能传播病毒。

接种疫苗后，仍应遵循一般性建议，例如洗手和开窗。

额外的疫苗注射-加强针

自2021年11月起，将提供额外的疫苗接种。

额外的疫苗接种为您提供更长久的保护，并将更大程度地减少病重的几率。

首先，以下人员将获得额外的疫苗接种：

- 年满80岁或80岁以上的人群
- 疗养护理院或机构中的人群
- 工作中接触患者的人群

之后，80岁以下的人群将获得额外的疫苗接种。

这将依照由长至幼的次序进行：首先是最年长的人群，其次是更年轻的人群。

关于新冠病毒，您若还有其他的问题：

请致电0800-1351咨询。

