

واکسن ضد کرونا



واکسن ضد کرونا چیست

واکسن ضد کرونا شما را در برابر ویروس کرونا محافظت می کند. واکسن در بازو شما تزریق میشود. بعد از واکسیناسیون ویروس شما را بیمار نمیکند یا کمتر بیمار میکند.

در بدن شما چه اتفاق می افتد

واکسیناسیون باعث ایجاد آنتی بادی علیه ویروس می شود. در نتیجه ، بدن شما ویروس را پس از واکسیناسیون تشخیص می دهد. بدن شما می تواند به سرعت ویروس را از بین ببرد. شما کمتر هیچ یا بیمار نمیشوید یا کمتر بیمار میشوید هنوز مشخص نیست که واکسیناسیون برای چه مدتی در برابر کرونا محافظت می کند.

آیا امن است

واکسن ها پس از آن که آماده شدند، روی افراد زیادی آزمایش شدند. سپس از طرف سازمان های EMA و CBG مورد تایید قرار گرفتند واکسن Pfizer/BioNTech روی کودکان از سن 5 سالگی نیز آزمایش شده است . این واکسن نیز برای کودکان مورد تایید قرار گرفته است. کودکان 5 تا 12 ساله یک دوز مخصوص برای کودکان دریافت می کنند.

واکسن ها اکنون مورد استفاده قرار گرفته اند و از نظر ایمنی نظارت میشوند.

اثرات جانبی

مانند سایر واکسن ها ، میتوانید پس از واکسیناسیون دچار شکایت شوید. که به آن اثرات جانبی گفته می شود.

به عنوان مثال ، شما می توانید از موارد زیر رنج ببرید:

- درد در جای تزریق
- سردرد
- خسته بودن
- کشیدگی عضله
- تب



اینها عوارض جانبی خفیفی هستند. آنها شایع هستند و پس از چند روز خود به خود از بین می روند.

یک عارضه جانبی به ندرت اتفاق می افتد. اما اگر در هفته های بعد از واکسیناسیون مشکلی پیدا میکنید با پزشک خود تماس بگیرید. از اواسط ژانویه 2022، کودکان از سن 5 سالگی نیز می توانند این واکسن را دریافت کنند.

واکسیناسیون برای چه کسی است

در هلند ، افراد ۱۲ سال به بالا می توانند برای واکسینه شدن درخواست قرار ملاقات کنند. این کار را می توان بصورت آنلاین یا تلفنی انجام داد. آنلاین میتوانید از طریق www.coronavaccinatie-afspraak.nl وقت بگیرید. یا از طریق شماره تلفن 0800 7070 وقت بگیرید.

چندین نوع واکسن وجود دارد. شما میتوانید نوع واکسن را انتخاب کنید.





در کدام صورت واکسینه نمی شوید

- با پزشک عمومی تماس بگیرید اگر:
- در گذشته پس از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته اید
- پس از تزریق ۱ واکنش آلرژیک شدید داشته اید

- بهتر است واکسیناسیون خود را به تعویق بیندازید و قرار ملاقات جدید بگیرید، اگر:
- بسیار بیمار هستند یا تب شدید دارید
- کرونا دارید
- شکایتی داشته باشید که اغلب با کرونا ربط دارد
- اگر تست کرونا را انجام داده اید و هنوز نتیجه را نمی دانید
- اگر با شخصی در تماس بودید که کرونا دراد

باردار

- زنان باردار بیشتر در معرض ابتلا به کرونا هستند
- به همین دلیل توصیه میشود: اگر باردار یا در تلاش برای باردار شدن هستید واکسن بزنید.
- این توصیه از سوی متخصصان هلندی مثل دکتر زنان، ماما ها و دکتر اطفال ارائه شده است.
- این پزشکان و دانشمندان روی اثرات واکسن در دوران بارداری تحقیق کرده اند.
- تحقیقات نشان داده اند که:

- واکسن برای زنان باردار خطری ندارد
- واکسن برای کسانی که برای باردار شدن تلاش دارند بی خطر است
- واکسن برای طفل در شکم شما بی خطر است
- واکسن احتمال مریضی شدید به دلیل مبتلا بودن به کرونا را بسیار کمتر میکند
- واکسن در صورت شیردهی بی خطر است
- آیا در مورد تزریق واکسن شک دارید؟ با ماما یا دکتر زنان در مورد آن صحبت کنید.

بعد از واکسیناسیون

اگر با اینکه واکسینه شده اید علائم کرونا را در خود مشاهده کردید، آزمایش دهید.

پس از واکسیناسیون، احتمال انتقال ویروس به افراد دیگر کمتر است اما شما همچنان می توانید ویروس را پس از واکسیناسیون منتقل کنید.

پس از واکسیناسیون، همچنان توصیه های کلی مانند شستن دست ها و باز کردن پنجره ها را دنبال کنید.

یک شات اضافی

بوستر شات ها از برج نوامبر 2021 انجام می شود. شات تقویت کننده تضمین می کند که شما برای مدت طولانی تری محافظت می شوید. این باعث می شود که شانس ابتلا به بیماری بسیار کمتر شود.

بوستر شات را میتوانید:

- سه ماه پس از آخرین واکسیناسیون خود دریافت کنید، یا
- سه ماه پس از بهبودی کرونا

سوال

آیا در مورد واکسیناسیون شک دارید و می خواهید در مورد آن صحبت کنید؟
می توانید با شماره 088-7555777 تماس بگیرید
همچنین می توانید وب سایت www.twijfeltelefoon.nl مراجعه کنید

آیا سوالات دیگری در مورد ویروس کرونا دارید:

با شماره 0800-1351 تماس بگیرید.