

新冠疫苗



什麼是新冠疫苗

新冠疫苗保護您免受新冠病毒的侵害。
您接受在上臂部位的接種注射。
接種疫苗後，您不會因感染病毒而患病，或病情相對輕微。

您體內發生了什麼變化

疫苗接種使得您體內產生對抗病毒的抗體。
因此，您的身體會在接種疫苗後識別出該病毒，
並可以迅速殺死病毒。您不會因而患病或患病機率減少。

目前尚不了解疫苗接種預防新冠病毒的保護期持續多久。

新冠疫苗安全嗎

疫苗研製成功後，便在許多人中就其進行了測試。
之後，由EMA（歐洲藥品管理局）和CBG（荷蘭藥品評估委員會）機構加以認可。

輝瑞/生物科技疫苗也在5歲以上的兒童中進行了測試。

該疫苗也被批准用於這組人群。
5至12歲的兒童接種兒童劑量。

現在已使用這些疫苗，並仍繼續監控其安全性。

副作用

與其他疫苗一樣，接種疫苗後您可能會出現不適，這就是所謂的副作用。

例如，您可能會出現以下不適症狀：

注射部位疼痛

頭痛

疲勞

肌肉酸痛

發燒

這些是輕微的副作用。它們很常見，幾天後會自行消失。

嚴重的副作用很少見。但是，如果您在接種疫苗後的幾週內出現諸多不適症狀，請致電家庭醫生諮詢。

誰應該接受疫苗接種

在荷蘭，任何年滿12歲的人都可以預約接種疫苗。

預約可在線或通過電話進行。

您可在以下網站上預約：www.coronavaccinatie-afspraak.nl。



電話預約請撥打：0800 7070。

目前有幾種不同的疫苗。

您無法選擇接種哪一種疫苗。

所有使用的疫苗都已經過測試和批准。

從2022年1月中旬開始，5歲以上的兒童亦可接種疫苗。



懷孕

孕婦更容易因感染新冠病毒而病情加重。
因此，建議是：如果您已懷孕或嘗試懷孕，請接種疫苗。
該建議來自於荷蘭的婦科醫生、產科醫生和兒科醫生。

安全

醫生和科學家們就懷孕期間的疫苗接種進行了研究。

研究表明：

- 疫苗對孕婦是安全的
- 如果您嘗試懷孕，疫苗是安全的
- 疫苗對您腹中的胎兒是安全的
- 疫苗大大降低您因感染新冠病毒而病重的機率
- 如果您是母乳喂養，疫苗是安全的

您尚不確定是否接種疫苗嗎？請諮詢您的助產士或婦科醫生。

加強針—一次額外的疫苗注射

自 2021 年 11 月起，將提供加強針的接種。
加強針為您提供更長久的保護，並將更大程度地減少病重的機率。

在以下時間您可以接種加強針：

1. 自您最後一次接種疫苗後3個月開始，或
2. 自感染新冠病毒痊癒後3個月開始。

何時不可接種疫苗

存在以下情況時，請致電您的家庭醫生：

- 以前接種疫苗後曾出現過敏反應
- 第一劑疫苗接種後出現嚴重的過敏反應

如果出現以下情況，您最好推遲疫苗接種並重新預約：

- 接種疫苗的當天病重
- 發燒38度或以上
- 患有新冠肺炎
- 出現新冠肺炎常見的不適症狀
- 如果您已接受新冠測試，但尚未得知檢測結果
- 如果您曾與新冠患者有過接觸

接種疫苗後

如果您在接種疫苗後仍然出現新冠症狀，請進行檢測。

接種疫苗後，您將病毒傳染給其他人的可能性較小。
但是，在接種疫苗後您仍可能傳播病毒。

接種疫苗後，仍應遵循一般性建議，例如洗手和開窗。

問題

您就疫苗接種尚有疑問並想談談嗎？

請致電 088-7555777。

您也可以查看網站：www.twijfeltelefoon.nl

**關於新冠病毒，您若還有其他的問題：
請致電0800-1351諮詢。**

